



## Tema 1: Funciones, Límites y Continuidad

**1.1.- Función Real de variable Real:** Una función numérica de una variable real es una ley que hace corresponder a cada elemento de un conjunto  $A$  un número real. La representaremos de la siguiente forma:

$$f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x)$$


**Ejemplo 1:**  $f: [1,3] \rightarrow \mathbb{R}$   
 $f(x) = 3x$

donde  $x$  es la variable independiente y  $f(x)$  es la variable dependiente.


Al conjunto  $A$  se le llama conjunto de definición de  $f$  o **dominio** (son los valores de  $x$  para los que la función está definida).

Se llama **recorrido** de una función  $f$ , al conjunto de valores que toma la variable dependiente  $f(x)$ .

Respecto a un sistema de referencia  $(O, \hat{i}, \hat{j})$  del plano, el conjunto de puntos  $M(x,y)$  del plano tales que  $x \in A, y = f(x)$ , se llama gráfica o curva de la función  $f$ .



Una función, **nunca vuelve hacia atrás**, ya que para cada valor de  $x$ , obtenemos un solo valor de  $f(x)$ .



- La función  $f: A \subset \mathbb{R}$  está **acotada superiormente**, si  $\forall x \in A, \exists c \in \mathbb{R} / f(x) \leq c$ . A los números  $c$  que cumplen esta propiedad se les llama mayorantes o cotas superiores de  $f$ .
- La función  $f: A \subset \mathbb{R}$  está **acotada inferiormente**, si  $\forall x \in A, \exists c \in \mathbb{R} / f(x) \geq c$ . A los números  $c$  que cumplen esta propiedad se les llama minorantes o cotas inferiores de  $f$ .

$f$  se dice que  $f$  está **acotada** si existen cotas superiores e inferiores, ó  $\exists P \in \mathbb{R}^+ / \forall x \in A, |f(x)| \leq P$

**Ejemplo 2:** Sea  $f: A \mapsto \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = x^2$

- Si  $A = [0,2]$ , la función está acotada superiormente:  $\forall x \in A, \exists c \in \mathbb{R} / f(x) \leq 4$ , y además, la función está acotada inferiormente ya que  $\forall x \in A, \exists c \in \mathbb{R} / f(x) > -7$

Por tanto la función es Acotada, por estar acotada superior e inferiormente.

- Si  $A = \mathbb{R}$ , la función no está acotada superiormente ya que cualquiera que sea el número real  $M$ , siempre existe un  $x$  tal que  $f(x) = x^2 \geq M$ . Esta función si está acotada inferiormente porque  $\forall x \in A, f(x) \geq 0$ .

Por tanto la función no es acotada porque no tiene cotas superiores.

## 1.2.- Operaciones con funciones:

OPERACIÓN	NOTACIÓN	OPERACIÓN	NOTACIÓN
Suma y diferencia	$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$	Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
Producto	$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ $(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x)$	Composición	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$ No es conmutativa.

### 1.2.1.- Composición de funciones:

Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones, componer dos funciones, es aplicar el resultado de una de ellas a la otra.

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)]: g \text{ compuesta con } f \quad (g \circ f)(x) = g[f(x)]: f \text{ compuesta con } g$$

**Ejemplo 3:** Sean  $f(x) = \frac{1}{x-1}$  y  $g(x) = x^2 - 1$

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = [f(x)^2 - 1] = \left(\frac{1}{x-1}\right)^2 - 1 = \frac{-x^2 + 2x}{(x-1)^2} \quad (f \circ g)(x) = f[g(x)] = \frac{1}{g(x)-1} = \frac{1}{x^2-1-1} = \frac{1}{x^2-2}$$

## 1.3.- Inversa de una función:

Dada una función  $f$ , se define su inversa y se representa por  $f^{-1}$ , como la función que verifica:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x) = x.$$


Para calcular la función inversa despejamos  $x$  en función de  $y$ .

**Ejemplo 4:** Sean  $f(x) = 2^x$  y su función inversa:  $f^{-1}(x) = \log_2(x)$

$$(f \circ f^{-1})(x) = f[f^{-1}(x)] = f[\log_2 x] = 2^{\log_2 x} = x$$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}[f(x)] = f^{-1}(2^x) = \log_2 2^x = x \log_2 2 = x$$

Gráficamente, una función y su inversa son simétricas respecto de la recta  $y=x$



## 1.4.- Funciones elementales de una variable real:

MODELO	GRÁFICA	MODELO	GRÁFICA
Polinómica	$a_n > 0$ $n$ par 	Exponencial	$0 < a < 1$ 
	$n$ impar 		$a > 1$ 
	$a_n < 0$ $n$ par 	Logarítmica	$0 < a < 1$ 
	$n$ impar 		$a > 1$ 
Irrracional	$n$ par 	sen x	
cos x		tg x	



- **Funciones Polinómicas**, son de la forma  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  y su dominio es  $\mathbb{R}$ .
- **Funciones Racionales**, son de la forma  $f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0}$  su dominio es  $\mathbb{R}$  menos los valores que anulan el denominador.
- **Funciones Irracionales**, son del tipo  $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ , siendo su dominio:
  - El mismo que el de  $g(x)$  si  $n$  es impar
  - El conjunto de valores reales que hagan  $g(x) \geq 0$  si  $n$  es par
- **Funciones exponenciales**, son de la forma  $f(x) = a^{g(x)}$ , con  $a > 0$  y  $a \neq 1$ , su dominio es el mismo que el de  $g(x)$ .
- **Funciones logarítmicas**, son de la forma  $f(x) = \log_a g(x)$ , con  $a > 0$ . Su dominio son los valores que hacen  $g(x) > 0$ .
- **Funciones circulares**:  $f(x) = \text{sen } x, f(x) = \text{cos } x$ , su dominio es  $\mathbb{R}$ .

A partir de estas dos, podemos definir el resto de funciones circulares:

$$\text{tg}(x) = \frac{\text{sen } x}{\text{cos } x}, \text{sec}(x) = \frac{1}{\text{cos } x} \text{ sus dominios son } \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2}(2k+1), k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\text{ctg}(x) = \frac{\text{cos } x}{\text{sen } x}, \text{cosec}(x) = \frac{1}{\text{sen } x} \text{ sus dominios son } \mathbb{R} - \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

- **Función Valor Absoluto**:  $f(x) = |x| = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \geq 0 \\ -f(x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$

### 1.5.- Funciones definidas a trozos:

Decimos que una función está definida a trozos si su expresión algebraica depende del intervalo en el que se encuentre el número real cuya imagen se quiere calcular. A cada trozo llamaremos *rama de la función*.

$$\text{Ejemplo 5: } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

### 1.6.- Limite de una función en un punto:

- ✓ Se dice que  $f$  tiene en el punto  $x_0$  el límite  $l$ , si  $\lim_{x \rightarrow l} f(x) = l$
- ✓ Una forma más rápida de calcular este límite es sustituir directamente  $x$  por el valor  $x_0$ .  

$$\lim_{x \rightarrow l} f(x) = f(x_0)$$

$$\text{Ejemplo 6: Sea } f(x) = 3x, \text{ calcular el límite de } f(x) \text{ en el punto } x_0 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} 3x = f(2) = 6$$

**1.6.1.- Límites laterales:** Si la función está definida a trozos, se dice que  $f$  tiene límite en un punto  $x_0$  si existen los límites laterales y estos coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow l^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow l^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow l} f(x) = l$$

$$\text{Ejemplo 7: Sea } f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

calcular el límite de  $f(x)$  en el punto  $x_0 = 0$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} 3x + 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 + 1 = 1 \end{aligned} \right\} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$



### 1.6.2.- Cálculo de límites:

- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$  (Si el resultado no es  $\infty - \infty$ )
- Si  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} [\lambda \cdot f(x)] = \lambda \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$  (Si el resultado no es  $0 \cdot \infty$ )
- Si  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow a} \left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$  (Si el resultado no es  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ )
- Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow a} \left[ \frac{1}{f(x)} \right] = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = 0$
- Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow a} \left[ \frac{1}{f(x)} \right] = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \frac{1}{0} = \infty$
- Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} = \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$  (Si no resulta  $\infty^0, 1^\infty, 0^0$ )

### 1.7.- Límites en el infinito:

Cuando  $x \rightarrow \infty$ , una función puede comportarse de diversas maneras:  $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm \infty \end{cases}$

#### 1.7.1.- Límite finito:

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$  Podemos conseguir que  $f(x)$  esté tan próximo de  $l$  como queramos, agrandando  $x$ .

#### Operaciones con los límites finitos:

Si  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$  y  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = b$ , se cumplen las siguientes relaciones:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = a + b$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = a - b$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = a \cdot b$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)} = \frac{a}{b}$  Si  $b \neq 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^{g(x)} = \left[ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)} = a^b$  Si  $f(x) > 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)} = \sqrt[n]{a}$  Si  $n$  es impar ó  $n$  es par pero  $f(x) \geq 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\log_b f(x)] = \log_b [\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)] = \log_b a$  Si  $b > 0$  y  $f(x) > 0$ .

#### 1.7.2.- Límite infinito

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm \infty$  Podemos conseguir que  $f(x)$  sea tan grande ó tan "negativa" como queramos simplemente con hacer  $x$  lo suficientemente grande.

**1.7.3.- Funciones equivalentes en un punto:**

Se dice que las funciones  $f$  y  $g$  son equivalentes en un punto  $a$  ( $a$  finito,  $+\infty, -\infty$ ), si:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Si en una expresión figura como factor o divisor una función, el límite no varía al sustituir dicha función por otra equivalente.

$x \rightarrow 0$	
Sen $x$	$X$
tg $x$	$X$
Arcsen $x$	$X$
Arctg $X$	$X$
$1 - \cos X$	$X^2/2$
$e^x - 1$	$X$
$\ln(1+x)$	$X$
$x \rightarrow 1$	
$\ln(x)$	$X - 1$
Sen $(X - 1)$	$X - 1$

**1.7.4.- Cociente de Polinomios:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^p + a'x^{p-1} + \dots}{bx^q + b'x^{q-1} + \dots} = \begin{cases} \pm \infty & \text{Si } p > q \\ 0 & \text{Si } p < q \\ \frac{a}{b} & \text{Si } p = q \end{cases}$$

**1.8.- Cálculo de Límites:**

Sumas	Productos	Cocientes	Potencias
$(+\infty) + (l) = (+\infty)$ $(+\infty) + (+\infty) = (+\infty)$ $(-\infty) + (l) = (-\infty)$ $(-\infty) + (-\infty) = (-\infty)$ $-(-\infty) = (+\infty)$	$(+\infty) \cdot (l) = \begin{cases} (+\infty) & \text{si } l > 0 \\ (-\infty) & \text{si } l < 0 \end{cases}$ $(+\infty) \cdot (+\infty) = (+\infty)$ $(-\infty) \cdot (l) = \begin{cases} (+\infty) & \text{si } l < 0 \\ (-\infty) & \text{si } l > 0 \end{cases}$	$\frac{(l)}{(\pm \infty)} = 0$ $\frac{(l)}{(0)} = (\pm \infty)$ si $l \neq 0$ $\frac{(\pm \infty)}{0} = (\pm \infty)$ $\frac{(0)}{(\pm \infty)} = (0)$	$(+\infty)^{(+\infty)} = (+\infty)$ $(+\infty)^{(-\infty)} = (0)$ $(+\infty)^{(l)} = (+\infty)$ si $l > 0$ $(+\infty)^{(l)} = (0)$ si $l < 0$ $(l)^{(0)} = 1$ si $l \neq 0$ Si $l > 1$ $\begin{cases} (l)^{(+\infty)} = (+\infty) \\ (l)^{(-\infty)} = (0) \end{cases}$ Si $0 < l < 1$ $\begin{cases} (l)^{(+\infty)} = (0) \\ (l)^{(-\infty)} = (+\infty) \end{cases}$

**1.9.- Límites indeterminados:**

Existen 7 tipos de indeterminaciones:  $\infty - \infty$   $\frac{0}{0}$   $\frac{\infty}{\infty}$   $0^0$   $(\pm \infty)^0$   $1^\infty$   $\infty^0$

Vamos a explicar como se resuelven algunas de ellas:

**Tipo  $\infty - \infty$** 

La forma de resolverla es efectuar la operación y estudiar la expresión resultante. Si aparecen raíces, utilizaremos el conjugado.

**Ejemplo 8:**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left[ \frac{x^2 - 6}{x(x-3)} - \frac{1}{x-3} \right] = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \left[ \frac{x^2 - 6}{x(x-3)} - \frac{x}{x(x-3)} \right] = \lim_{x \rightarrow 3} \left[ \frac{x^2 - 6 - x}{x(x-3)} \right] = \lim_{x \rightarrow 3} \left[ \frac{x+2}{x} \right] = \frac{5}{3}$$

**Tipo  $0/0$** 

Normalmente se da en el cociente de polinomios., para resolverla, tenemos que dividir numerador y denominador por la raíz que haga cero el denominador. Si aparecen raíces utilizaremos el conjugado.



$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{P_1(x)(x-c)}{Q_1(x)(x-c)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{P_1(x)}{Q_1(x)}$$

**Ejemplo 9:**

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^3 + 2x^2 + 5x + 10} = \frac{0}{0} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^3 + 2x^2 + 5x + 10} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-2)}{(x+2)(x^2+5)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-2}{x^2+5} = \frac{-4}{9}$$

**Tipo**  $\frac{\infty}{\infty}$ 

Normalmente se da en el cociente de polinomios. La forma de resolverla es comparar los infinitos de numerador y denominador.

**Ejemplo 10:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 7}{x^3 + 2x^2} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 7}{x^3 + 2x^2} = 0 \text{ porque el grado del numerador es menor que el del denominador}$$

**Tipo**  $\infty \cdot 0$ 

Esta indeterminación la transformaremos en una del tipo  $\frac{\infty}{\infty}$

**Tipo**  $1^\infty$ 

Utilizaremos la "**regla del zapato**" ó regla del n° e.  $\lim(f(x))^{g(x)} = e^{\lim(f(x)-1) \cdot g(x)}$

Sabemos que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 2,7172\dots = e$ , pues trataremos de convertir límites con indeterminación de este tipo en límites de esta forma.

**Ejemplo 11:**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 7}{x^2 + 2}\right)^{3x} &= 1^\infty \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 7}{x^2 + 2}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2 - 9}{x^2 + 2}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2}{x^2 + 2} + \frac{-9}{x^2 + 2}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-9}{x^2 + 2}\right)^{3x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x^2 + 2}{-9}}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x^2 + 2}{-9}}\right)^{\frac{x^2 + 2}{-9} \cdot \left(\frac{-9}{x^2 + 2}\right) \cdot 3x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-9}{x^2 + 2}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-27x}{x^2 + 2}\right) = e^0 = 1 \end{aligned}$$

Estas y el resto de indeterminaciones las resolveremos más adelante de otra forma, utilizando la regla de L' Hôpital.

**1.10.- Continuidad de una función en un punto:**

Sea  $f$  una función real definida en un intervalo  $I$ , y a un punto de  $I$ . Se dice que la función  $f$  es continua en el punto  $c$  si y solo si existe el límite de  $f$  en el punto  $c$  y éste es igual a  $f(c)$ .

Por tanto, una función  $f$  es continua en el punto  $c$  si se cumple:

- La función  $f$  está definida en  $c$ , es decir, existe  $f(c)$
- Existe  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$



La función  $f$  es continua en el punto  $c$  si es continua por la derecha y por la izquierda ó si los límites laterales coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$$

Existen cuatro casos de discontinuidad:

$f(x)$ no definida en $C$	De salto	Evitable	Asintótica
La función no está definida en el punto $C$	No coinciden los límites laterales de la función en el punto $C$ .	No coincide el límite de la función en el punto $C$ , con el valor de la función en el punto $C$ .	No existe alguno de los límites laterales de la función en el punto $C$ .
<b>Ejemplo:</b>	<b>Ejemplo:</b>	<b>Ejemplo:</b>	<b>Ejemplo:</b>
$f(x) = \begin{cases} x-2 & \text{si } x \neq 3 \\ 4 & \text{si } x = 3 \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} 3x-1 & \text{si } x < 2 \\ x^2+2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} 3x-1 & \text{si } x \neq 1 \\ 4 & \text{si } x = 1 \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ \text{sen } \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$
$f(3) = ?$	$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 3x-1 = 5$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2+2 = 6$	$f(1) = 4$ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} 3x-1 = 2$	$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sen } \frac{1}{x} = +\infty$

Todas las funciones elementales descritas con anterioridad son continuas en su dominio de definición, excepto:

- **Funciones Racionales:** Son discontinuas en los puntos que no son del dominio, es decir, donde  $Q(x)=0$ . Las discontinuidades son de tipo asintótico o evitables, en ningún caso pueden ser de salto.
- **Funciones Trigonométricas:** La tangente, la secante, la cosecante y la cotangente presentan discontinuidades asintóticas en los puntos que no son de su dominio.
- **Funciones a trozos:** Se debe estudiar la continuidad de cada rama en su dominio, y la continuidad en el punto donde cambiamos de rama, donde puede aparecer una discontinuidad de salto.

### 1.11.- Propiedades de las funciones continuas:

Sean  $f$  y  $g$  funciones continuas en un punto  $c$ , entonces:

- ✓  $f + g$  es una función continua en  $c$ .
- ✓  $\lambda \cdot f$  es una función continua en  $c$ .
- ✓  $\frac{f}{g}$  es una función continua en  $c$ , si  $g(c) \neq 0$
- ✓  $|f|$  es una función continua en  $c$ .

### 1.12.- Continuidad en un intervalo:

La función  $f$  es **continua en el intervalo  $I=(a,b)$**  si es continua en todo punto de  $(a,b)$ .



La función es **continua en el intervalo  $I=[a,b]$**  si es continua en todo punto de  $(a,b)$ , continua por la derecha en el punto  $a$  y continua por la izquierda en el punto  $b$ .

- ✓ Las **funciones polinómicas** son continuas en todo intervalo real.
- ✓ Las **funciones racionales** son continuas en un todo intervalo real donde no aparezcan las raíces del denominador.
- ✓ Las **funciones trigonométricas**  $\text{sen}(x)$ ,  $\text{cos}(x)$  son continuas en todo intervalo real.
- ✓ Las **funciones  $\text{tg}(x)$ ,  $\text{sec}(x)$**  son continuas en todo intervalo real donde  $\text{cos}(x) \neq 0$ .
- ✓ Las **funciones  $\text{ctg}(x)$ ,  $\text{cosec}(x)$**  son continuas en todo intervalo real donde  $\text{sen}(x) \neq 0$ .
- ✓ La **función exponencial**,  $a^x$  con  $a > 0$  es continua en todo intervalo real.
- ✓ La **función logarítmica**,  $\log_a(x)$  con  $a > 0$  es continua en el intervalo  $(0, +\infty)$

### 1.13.- Teorema de Weierstrass:


Si una función es continua en un intervalo  $I=[a,b]$ , cerrado y acotado, entonces alcanza en él, al menos una vez su máximo y mínimo absolutos.

### 1.14.- Teorema de los Ceros de Bolzano:

Si una función  $f$  continua en un intervalo  $[a,b]$  cambia de signo, es decir  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , existe al menos un punto  $c$  del intervalo en el que la función vale 0.

$f$  continua en  $[a,b]$ , y  $f(a) \cdot f(b) < 0 \rightarrow \exists c \in (a,b)$  en el que  $f(c)=0$

Geométricamente, el teorema establece que si dos puntos  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$  de la gráfica de una función continua están situados en diferentes lados del eje  $X$ , entonces la gráfica corta al eje  $X$  en algún punto entre  $a$  y  $b$ . Por supuesto que pueden existir varios puntos de corte con el eje  $X$ .



**Ejemplo 12:** Calcular  $a$  y  $b$  para que la función definida por  $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2} & \text{si } x \leq 0 \\ ax + b & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 + x \ln x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$  sea continua

La función  $f$  es una función definida a trozos compuesta por tres ramas, la primera rama es el producto de una polinómica por una exponencial, que es continua, porque las funciones exponenciales y las polinómicas son siempre continuas, la segunda rama es una función polinómica, y por tanto continua, la tercera rama es la composición de una polinómica y una logarítmica, que está bien definida porque  $x > 1$ , así que también es continua siempre, por tanto esta función solo puede tener problemas de continuidad en los puntos en los que cambia de rama. O sea en  $x=0$  y  $x=1$ . Estudiemos esos puntos:

Una función es continua en un punto  $x=a$  si ocurre:  $\begin{cases} \exists f(a) \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \end{cases}$

En  $x=0$ :

$$f(0) = 0; \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b; \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \rightarrow \text{Por tanto para que } f \text{ sea continua en cero } b=0.$$

En  $x=1$ :

$$f(1) = 1; \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1; \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a + b \rightarrow \text{Por tanto para que } f \text{ sea continua en uno, } a+b=1.$$

Y para que la función sea continua, se han de cumplir las dos condiciones, por tanto  $f$  es continua si  $b=0$  y  $a=1$ .

**1.15.- Ejercicios:**

1.- Determinar el valor de a para que:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax + 1} - x) = 2$

2.- Calcular:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x})$

3.- Calcular el límite de la función  $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ , en el punto 0, en el punto 1 y en  $+\infty$

4.- Calcular el siguiente límite:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x+3}{2x-1} \right)^x$

5.- Calcular el valor de la constante c para que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+3}{x} \right)^{cx} = e$

6.- Estudiar en el cuerpo real la continuidad de la función definida por:  $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ e^x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

7.- Determinar a y b para que la función real f, definida por  $f(x) = \begin{cases} ae^{\frac{\text{sen}^2 x}{x}} + b \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ 3a \frac{\text{sen} x}{x} + b(x-1) & \text{si } x > 0 \end{cases}$  sea

continua en la recta real.

8.- Probar que la función definida por  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^3 + 7x - 8}$  no es continua en  $x=1$ . Indicar que tipo de discontinuidad presenta.

9.- Usando el teorema de Bolzano, demostrar que la ecuación  $x^3 + x - 5 = 0$  tiene al menos una solución  $x_0$  tal que  $1 < x_0 < 2$ .

10.- Sea  $f: [-1,3] \rightarrow \mathbb{R}$ , la función definida por:  $f(x) = |x^2 - 4|$

a) Es f continua en  $[1,-3]$ ?

b) Enuncia un teorema en virtud del cual se puede afirmar que la función f alcanza sus extremos absolutos en el intervalo  $[-1,3]$ .

11.- Enunciar el teorema de bolzano. Sea la función  $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$ . Se tiene que  $f(-3)=4$  y  $f(-1)=-2$ , pero la gráfica de f no corta el eje de abcisas en el intervalo  $[-3,-1]$ . Razonar si esto contradice el teorema de Bolzano.

12.- Probar que las gráficas  $f(x) = \ln x$  y  $g(x) = e^{-x}$  se cortan en algún punto del intervalo  $[1,e]$ .

**1.16.- Soluciones:**

1. - **Determinar el valor de a para que:**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax + 1} - x) = 2$

Tenemos una indeterminación del tipo  $\infty - \infty$ , por tanto vamos a multiplicar y dividir por el conjugado:



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + ax + 1} - x)(\sqrt{x^2 + ax + 1} + x)}{(\sqrt{x^2 + ax + 1} + x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + ax + 1 - x^2}{(\sqrt{x^2 + ax + 1} + x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + 1}{(\sqrt{x^2 + ax + 1} + x)} = \frac{a}{2}$$

De donde  $a = 4$ .

2. - **Calcular:**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x})$

Como tenemos  $\infty - \infty$ , multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + ax} - x)(\sqrt{x^2 + ax} + x)}{(\sqrt{x^2 + ax} + x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + ax - x^2}{(\sqrt{x^2 + ax} + x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax}{(\sqrt{x^2 + ax} + x)} = \frac{a}{2} \end{aligned}$$

3. - **Calcular el límite de la función  $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ , en el punto 0, en el punto 1 y en  $+\infty$**

En  $x = 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

En  $x = 1$ :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \cos x}{x^2} = 1 - \cos 1$$

En  $x = \infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} = 0,$$

porque la función  $1 - \cos x$  es una función acotada entre 0 y 2, y el denominador tiende a  $+\infty$  cuando  $x$  tiende a  $+\infty$ .

4. - **Calcular el siguiente límite:**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x+3}{2x-1} \right)^x$

Utilizando la regla del "zapato", tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x+3}{2x-1} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x+3}{2x-1} - 1 \right) \cdot x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x+3}{2x-1} - 1 \right) \cdot x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x+3-2x+1}{2x-1} \right) \cdot x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{4x}{2x-1} \right)} = e^2$$

5. - **Calcular el valor de la constante  $c$  para que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+3}{x} \right)^{cx} = e$**

Utilizando la regla del "zapato":

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+3}{x} \right)^{cx} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+3}{x} - 1 \right) \cdot cx} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3}{x} \right) \cdot cx} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} 3c} = e^{3c} \rightarrow c = \frac{1}{3}$$



6.- Estudiar en la continuidad de la función definida en  $\mathbb{R}$  por:  $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ e^x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

La función  $f$  es una función definida a trozos compuesta por dos ramas, la primera rama es el cociente de dos funciones exponenciales, que es continua, porque las funciones exponenciales son siempre continuas y  $e^x + 1$  es siempre distinto de cero, la segunda rama es una función polinómica, y por tanto continua, por tanto esta función solo puede tener problemas de continuidad en el punto en el que cambia de rama. O sea, en  $x=0$ . Estudiemos ese punto:

La función es continua en el punto  $x=0$  si ocurre:  $\begin{cases} \exists f(0) \\ \exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \end{cases}$

$$f(0) = \frac{1}{2}; \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1; \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{1}{2} \rightarrow \text{Por tanto la función no es continua en } x=0.$$

Así que la función  $f(x)$  es una función continua en  $\mathbb{R} - \{0\}$ , donde presenta una discontinuidad de salto.

7.- Determinar  $a$  y  $b$  para que la función real  $f$ , definida por  $f(x) = \begin{cases} ae^{\frac{\sin^2 x}{x}} + b \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ 3a \frac{\sin x}{x} + b(x-1) & \text{si } x > 0 \end{cases}$

sea continua en la recta real.

Para que esta función sea continua en toda la recta real, tiene que ser continua en todos los puntos de la recta real, pero vemos que para  $x=0$ , la función no está definida, así que como no es continua en  $x=0$ , no puede ser continua en toda la recta real, y por tanto no existen  $a$  y  $b$  que hagan que esta función sea continua.

8- Probar que la función definida por  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^3 + 7x - 8}$  no es continua en  $x=1$ . Indicar que tipo de discontinuidad presenta.

Lo primero es factorizar el denominador, y para ello utilizamos la regla de Ruffini.

$x^3 + 7x - 8 = (x-1)(x^2 + x + 8)$ , por tanto la función:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^3 + 7x - 8} = \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x^2 + x + 8)}$$

La función no está definida en  $x=1$ , por tanto no es continua, presenta una discontinuidad de segunda especie, llamada discontinuidad asintótica.

9.- Usando el teorema de Bolzano, demostrar que la ecuación  $x^3 + x - 5 = 0$  tiene al menos una solución  $x_0$  tal que  $1 < x_0 < 2$ .

El teorema de Bolzano dice que si tenemos una función definida en un intervalo  $[a,b]$  cerrado y acotado, en el que la función es continua y además cambia de signo, entonces esta función pasa por el cero:  $\exists c \in ]a,b[ / f(c) = 0$ .



Por tanto si definimos la función  $f(x) = x^3 + x - 5$  en el intervalo  $[1,2]$ , como la función es continua en dicho intervalo por ser polinómica, y además:  $f(1)=-3$  y  $f(2)=5$ , entonces vemos que cambia de signo, entonces según Bolzano:  $\exists c \in ]1,2[ / f(c) = 0$ .

Por lo que podemos asegurar que la ecuación  $x^3 + x - 5 = 0$  tiene al menos una solución  $x_0$  tal que  $1 < x_0 < 2$

**10- Sea  $f : [-1,3] \rightarrow \mathbb{R}$ , la función definida por:  $f(x) = |x^2 - 4|$**

**a) Es  $f$  continua en  $[-1,3]$ ?**

**b) Enuncia un teorema en virtud del cual se puede afirmar que la función  $f$  alcanza sus extremos absolutos en el intervalo  $[-1,3]$ .**

La función  $f(x)$  es la composición de la función valor absoluto y una función polinómica, por tanto es continua porque ambas son continuas y la composición de funciones también lo es.

Así que si  $f$  es continua en todo  $\mathbb{R}$ , también lo será en el intervalo  $[-1,3]$ .

El teorema que me asegura que una función alcanza sus extremos absolutos en un intervalo es el teorema de Weierstrass: "Una función  $f$  continua en un intervalo cerrado y acotado  $[a,b]$ , alcanza en este intervalo, al menos una vez su máximo y mínimo absolutos".

**11- Enunciar el teorema de Bolzano. Sea la función  $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$ . Se tiene que  $f(-3)=4$  y  $f(-1)=-2$ , pero la gráfica de  $f$  no corta el eje de abscisas en el intervalo  $[-3,-1]$ . Razonar si esto contradice el teorema de Bolzano.**

El teorema de Bolzano dice: "Sea  $f$  una función definida en un intervalo  $[a,b]$  cerrado y acotado, en el que la función es continua y en el que además la función cambia de signo, entonces esta función pasa por el cero:  $\exists c \in ]a,b[ / f(c) = 0$ "

No contradice el Teorema de Bolzano, porque este teorema exige que la función sea continua en el intervalo, y esta función no es continua en  $[-3,-1]$ , porque en  $x=-2$  no está definida, y por tanto no es continua.

**12.- Probar que las gráficas  $f(x) = \ln x$  y  $g(x) = e^{-x}$  se cortan en algún punto del intervalo  $[1,e]$ .**

Lo que hacemos es crear una nueva función  $h(x) = f(x) - g(x) = \ln x - e^{-x}$ , en los puntos donde  $h(x)=0$ , son los puntos en los que las gráficas de las funciones  $f$  y  $g$  se cortan.

Así que estudiamos la función  $h(x) = \ln x - e^{-x}$  en el intervalo  $[1,e]$ .

La función  $h(x)$  es una función continua por ser la diferencia de dos funciones que son continuas en  $[1,e]$ . Veamos si  $h(x)$  cambia de signo en este intervalo:

$h(1) = -\frac{1}{e}$  y  $h(e) = 1 - \frac{1}{e^e} > 0$ , por tanto vemos que la función cambia de signo. Entonces según el teorema de Bolzano  $\exists c \in ]a,b[ / h(c) = 0$ , bien pues si  $h(c) = f(c) - g(c) = 0$ , entonces ocurre que  $f(c) = g(c)$ , y el punto  $c$  es el punto de corte de ambas funciones.